

NAVODILA ZA ODDAJO BLATA

Posodico z žličko dobite v laboratoriju pri sprejemnem okencu ali jo lahko kupite v lekarni.

Navodilo za odvzem blata na parazite


Zajedavci se izločajo z blatom občasno (ciklično) in njihovo število precej niha. Zato zdravnik naroči en ali več vzorcev blata. Odvzem več kot enega vzorca v istem dnevu je neustrezen, prav tako je neustrezen odvzem več vzorcev blata v treh zaporednih dneh. Priporoča se, da se vzorci blata odvezamejo vsak drugi dan, oziroma v času desetih dni. V laboratoriju določamo prisotnost jajčeca (izjemoma nativno obliko) parazitov.

Zbiranje vzorca:

- Priporočamo, da vzorec blata odvezamete pri prvem odvajanju v dnevu,
- izpraznite mehur in splaknite straniščno školjko,
- v straniščno školjko položite več slojev razgradljivega papirja tako, da bo papir začasno zadržal blato in boste lažje vzeli vzorec blata,
- opravite odvajanje blata,
- z žličko ki je na pokrovu posodice zberite zadostno količino vzorca blata **velikosti zrna graha/lešnika** (1-2 g ali za tekoče vzorce 1-2 ml),
- vzorce vzamemo iz različnih delov blata in posodico dobro zapremo,
- vzorci blata morajo biti odvzeti v čiste, suhe posodice, brez konzervansov ali transportnega medija (dobite jih v laboratoriju).

Odvzem vzorca opravite takoj po iztrebljenju. Vzorci ne smejo biti kontaminirani z vodo, solmi ali urinom. Vzorci se pred uporabo lahko hranijo 1-2 dni v hladilniku na 2 do 8 °C.

Posodico z blatom označite z imenom, priimkom in datumom rojstva, ustrezno zaščitite (vrečka, papir) in prinesite na odvezemno mesto (okence laboratorija).



Navodilo za odvzem blata za dokazovanje krvi v blatu (okultna kri)

Ugotavljanje okultne ali nevidne krvi v blatu je postopek za odkrivanje bolezni prebavil. Pred odvzemom vzorca ne spreminjajte prehranskih navad in ne opuščajte zdravil, ki vam jih je predpisal vaš zdravnik. Vzorec blata mora biti svež saj kri v blatu razpade in zato lahko dobimo lažno negativne rezultate.


Vzorec blata **ne odvezamemo** če:

- imate menstruacijo (mesečno perilo), vzorec odvezamemo 3 dni po končani menstruaciji,
- imate drisko, potrebno je prej urediti prebavo potem pa odvzeti vzorec,
- imate hemoroide, ki jih je ugotovil zdravnik in sveže krvavijo (dobimo lažno pozitivne rezultate in se je o tem potrebno dogovoriti z zdravnikom).

Odvzem vzorca izvajamo na enak način kot pri preiskavi »Navodilo za odvzem blata na parazite«. Posodico z blatom označite z imenom, priimkom in datumom rojstva, ustrezno zaščitite (vrečka, papir) in prinesite na odzemno mesto (okence laboratorija).

V primeru, da smo dobili originalno posodico proizvajalca sledimo spodnjim navodilom:


POSTOPEK ODVZEMA VZORCA




1 Namestite straniščni papir v straniščno školjko.




2 Opravite odvajanje na straniščni papir. Odvzem vzorca bo lažji, če se na straniščno školjko usedete v obratni smeri kot ponavadi.




3 Odvijte zelen (ali vijoličen) pokrovček z nameščeno paličico za odvzem vzorca.



4 Površino blata navkrižno razdelite na 4 področja in v vsako enkrat potopite paličico. Odvzemite le toliko blata, da je zapolnjen navoj na paličici.



5 Paličico vstavite nazaj v epruveto in močno privijte zelen (ali vijoličen) pokrovček. Ne odpirajte ponovno epruvete.



6 Do analiziranja hranite epruveto z odvzetim vzorcem v hladilniku in stran od vira svetlobe. Epruveto z vzorcem čimprej pošljite v analizo.

Kra. 11561N-1.02